



## Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

# Voltax®

### Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

#### Arzneilich wirksame Bestandteile:

Phospholipide aus Sojabohnen (Lecithin)	7,300 g
Fluidextrakt aus Potenzholz (1:1)	1,50 g
Adenosin	20,00 mg
Tocofersolan	0,20 g
Thiaminchloridhydrochlorid	50,00 mg
Riboflavinphosphat-Natrium	12,00 mg
Nicotinamid	0,10 g

#### Sonstige Bestandteile:

Fructose (Fruchtzucker)-Sirup, gereinigtes Wasser, Ethanol 96 %, Phosphorsäure, Natriumhydroxid, Aroma: Melissengeist.

#### Darreichungsform und Inhalt:

Packung mit 250 ml Flüssigkeit.

#### Traditionelles Arzneimittel

  
**ARZNEIMITTEL**

Dr. Poehlmann & Co. GmbH · Loerfeldstraße 20 · 58313 Herdecke



## **Anwendungsgebiete:**

Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie VOLTAX® nicht einnehmen?*

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile soll VOLTAX® nicht eingenommen werden.

## **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. VOLTAX® sollte deshalb nicht angewendet werden.

*Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit.*

Bisher sind keine Risiken im empfohlenen Dosisbereich bekannt geworden. Schwangere sollten ohne ärztliche Verordnung die Dosierungsanleitung streng einhalten.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Dieses Arzneimittel enthält 15 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (15 ml) bis zu 1,8 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

*Worauf müssen Sie noch achten?*

Für Diabetiker (Zuckerkrankte): 1 Meßbecher (15 ml) enthält 3,4 g Fructose (entsprechend 0,28 BE).

*Hinweis:*

Falls eine Fructose-Verwertungsstörung bekannt ist oder nicht ausgeschlossen werden kann, soll das Arzneimittel nicht angewendet werden.

## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt keine anderslautenden Angaben zur Dosierung gemacht hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da VOLTAX® sonst nicht wirken kann.

*Wieviel und wie oft sollten Sie VOLTAX® einnehmen?*

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre nehmen 2–3 mal täglich 15 ml VOLTAX® ein.

*Wie und wann sollten Sie VOLTAX® einnehmen?*

Die Einnahme der Flüssigkeit sollte unter Verwendung des beiliegenden Meßbechers 2–3 mal täglich jeweils zu den Mahlzeiten erfolgen.

*Wie lange sollten Sie VOLTAX® einnehmen?*

Beachten Sie bitte den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

*Was ist zu tun, wenn VOLTAX® in zu großen Mengen eingenommen wurde?*

Der Alkoholgehalt von VOLTAX® entspricht dem eines Südweines, daher ist bei der Einnahme zu großer Mengen der Alkoholgehalt zu berücksichtigen. Gegenmaßnahmen nach Überdosierung sind in der Regel nicht erforderlich. Sollten jedoch Beschwerden auftreten, befragen Sie bitte Ihren Arzt.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig VOLTAX® eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?*

Die Einnahme sollte ohne Berücksichtigung der ausgelassenen Menge fortgesetzt werden.

### **Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von VOLTAX® auftreten?*

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bei sich beobachten sollten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Sollten Nebenwirkungen auftreten, setzen Sie das Präparat bitte ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Öffnen des Behältnisses ist VOLTAX® bei Beachtung der Dosierungsanleitung bis zum vollständigen Aufbrauch der Packung haltbar.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

### **Stand der Information:**

Mai 2002

3200502

